

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

OMEPRAZOL DENVER FARMA

OMEPRAZOL 20 mg

Cápsulas

Vía de administración oral

Venta Libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE?

Fórmula/Principio activo: Omeprazol 20 mg.

Ingredientes inactivos (excipientes): Azúcar; Almidón; Ortofosfato disódico hidrogenado; Laurilsulfato de sodio; Metilparabeno sódico; Propilparabeno sódico; Hidroxipropilmetilcelulosa 5cps; Ácido metacrílico L30-D55 (Dispersión al 30 %); Polietilenglicol; Dióxido de titanio; Talco; Tween-80; Hidróxido de sodio pellets.

Cápsulas de gelatina N°2:

Composición de la Tapa: Azul brillante FCF (CI 42090); Floxina B Rojo N°28 (CI 45410); Gelatina c.s.p. 23,00 mg

Composición del cuerpo: Azul brillante FCF (CI 42090); Rojo Allura AC (CI 16035); Amarillo Ocaso FCF (CI 15985); Dióxido de titanio; Gelatina c.s.p. 37,00 mg.

ACCIÓN:

Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA OMEPRAZOL DENVER FARMA?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR OMEPRAZOL DENVER FARMA?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida,
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones,
- tiene diarrea prolongada o que no mejora,
- acidez desde hace más de tres meses,
- acidez con mareos o transpiración,
- dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello,
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez,
- pérdida de peso inexplicable,
- dolor de estómago, náuseas o vómitos,
- trastornos renales y/o hepático.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de

cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.

Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

- Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:
- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
 - Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
 - Diazepam (medicamento sedante);
 - Digoxina (medicamento para el corazón);
 - Teofilina (medicamento broncodilatador);
 - Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores);
 - Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamento para la infección VIH-SIDA);
 - Fenitoína (medicamento antiépiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Es de administración oral en adultos mayores de 18 años.

Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique las cápsulas.

No exceda la dosis de una cápsula diaria sin consultar a su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.

Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

No se debe tomar omeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

al 4756-5436 ó a la Página Web de Denver Farma: www.denverfarma.com.ar

ANMAT Responde: 0800 333 1234

CONSERVACIÓN DE OMEPRAZOL DENVER FARMA

Conservar entre 10°C y 30°C. Proteger de la luz.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DEL LOS NIÑOS”

PRESENTACIÓN

OMEPRAZOL DENVER FARMA 20 mg

Envases con 14 cápsulas.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.612

DENVER FARMA S.A.

Mozart s/n, Centro Industrial Garín, Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: José Luis Tombazzi –Farmacéutico

Fecha de la última revisión: Junio 2024

Rv: 08/24
Cód. 7378