

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

# PANTOPRAZOL DENVER FARMA

## PANTOPRAZOL 20 mg

### Comprimidos gastroresistentes

#### Vía de administración oral

Venta Libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

#### ¿QUÉ CONTIENE?

Fórmula/Principio activo: Pantoprazol Sódico Sesquihidrato (Equivalente a Pantoprazol 20 mg) 22,55mg.

Ingredientes inactivos (excipientes): Manitol, Povidona, Crospovidona, Carbonato de sodio anhidro, Croscarmellosa sódica, Estearato de magnesio, Copovidona, Propilenglicol, Talco, Dióxido de titanio, Eudragit L 30 D55, Trietilcitrateo.

#### ACCIÓN:

Reduce la producción de ácido estomacal.

#### ¿PARA QUÉ SE USA PANTOPRAZOL DENVER FARMA?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

#### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PANTOPRAZOL DENVER FARMA?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted tiene:

- dificultad o dolor al tragar la comida,
- vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones,
- diarrea prolongada o que no mejora,
- acidez desde hace más de tres meses,
- acidez con mareos o transpiración,
- dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello,
- dolor de pecho frecuente,
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez,
- pérdida de peso inexplicable,
- dolor de estómago, náuseas o vómitos,
- trastornos renales y/o hepático.
- Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.

Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:

- dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales,
- erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol,
- no se debe tomar Pantoprazol como medicación preventiva.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante);
- Digoxina (medicamento para el corazón);
- Teofilina (medicamento broncodilatador);
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores);
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamento para la infección VIH-SIDA);
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Pantoprazol.

#### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

**Es de administración oral en adultos mayores de 18 años.**

Tome un comprimido gastroresistente con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique los comprimidos gastroresistentes.

No exceda la dosis de un comprimido gastroresistente diaria sin consultar a su médico.

#### No tome por más de 14 días sin consulta médica.

**Si sus síntomas de ardor, acidez o regurgitación empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.**

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

Menores de 18 años de edad deben consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

#### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL

MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

#### ¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

al 4756-5436 ó a la Página Web de Denver Farma: [www.denverfarma.com.ar](http://www.denverfarma.com.ar)

ANMAT Responde: 0800 333 1234

#### CONSERVACIÓN DE PANTOPRAZOL DENVER FARMA

Conservar entre 5°C y 30°C.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DEL OS NIÑOS”**

#### PRESENTACIÓN

PANTOPRAZOL DENVER FARMA 20 mg

Invasos con 14 comprimidos gastroresistentes.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51.448

#### DENVER FARMA S.A.

Mozart s/n, Centro Industrial Garín, Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: José Luis Tombazzi –Farmacéutico

Fecha de la última revisión: Junio 2024

Rv: 08/24

Cód. 7379