

**Cómo almacenar CIPROFLOXACINA DENVER FARMA**

Conservar a temperatura ambiente, preferentemente menor a 30°C.

**Presentación de CIPROFLOXACINA DENVER FARMA**

Se expende en envase contenido 5 ml de solución oftálmica.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 44.874

**DENVER FARMA S.A.**

Natalio Querido 2285

(B1605CYC) Munro, Provincia de Buenos Aires.

Elaborado en su planta de Manufactura Centro Industrial Garín.

Director Técnico: José Luis Tombazzi –Farmacéutico.

Rv 01/17

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE****CIPROFLOXACINA DENVER FARMA  
CIPROFLOXACINA 0.3 %  
Solución oftálmica estéril**

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

Lea detenidamente toda la información antes de empezar a aplicarse este medicamento.

- Conserve este prospecto ya que puede necesitar leerlo nuevamente.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento le ha sido recetado a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que podría perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos o si sufre un efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento sólo puede ser dispensado con receta médica.

**¿Qué contiene CIPROFLOXACINA DENVER FARMA?**

Cada ml de solución oftálmica contiene:

Ciprofloxacina (como clorhidrato) 3 mg

Excipientes: Acetato de sodio, Ácido acético, Manitol, Edetato disódico, Cloruro de benzalconio, Agua para inyectable c.s.

**¿Qué es CIPROFLOXACINA DENVER FARMA y cuál es su uso?**

CIPROFLOXACINA DENVER FARMA pertenece al grupo de medicamentos conocidos como antibióticos quinolónicos.

Este medicamento se usa para el tratamiento de las úlceras de córnea y para algunas infecciones bacterianas oculares.

**Antes de empezar a usar CIPROFLOXACINA DENVER FARMA****No use CIPROFLOXACINA DENVER FARMA:**

- Si usted es alérgico (hipersensibilidad) a la Ciprofloxacina o algún antibiótico quinolónico o algún otro componente de la fórmula.

Consulte con su médico.

**Tenga especial cuidado:**

- Solamente use CIPROFLOXACINA DENVER FARMA en sus ojos.
- Solamente use CIPROFLOXACINA DENVER FARMA en niños menores de 1 año, si el médico se lo prescribió.
- Al igual que otros antibióticos, usar CIPROFLOXACINA DENVER FARMA por un tiempo prolongado puede conducir a otras infecciones. Si los síntomas empeoran o vuelven repentinamente, consulte con su médico. Después del uso de este medicamento, especialmente por un periodo prolongado, usted puede volverse más susceptible a otras infecciones.
- Interrumpa el tratamiento e inmediatamente contacte a su médico, a los primeros signos de sarpullido en la piel o alguna otra reacción alérgica, incluyendo urticaria, picazón, problemas de respiración. Si la reacción alérgica es seria, usted necesita un tratamiento de emergencia.
- Interrumpa el tratamiento y contáctese con su médico si siente dolor, hinchazón o inflamación, en el momento o poco después de aplicarse el medicamento.
- Si usted es un paciente anciano o está tomando corticoides, que se usan en el tratamiento de las siguientes condiciones: dolor e inflamación, asma o problemas de la piel, puede tener un alto riesgo de sufrir problemas en los tendones

musculares durante el tratamiento con CIPROFLOXACINA DENVER FARMA. Si experimenta alguna inflamación o condición inflamatoria, interrumpa el tratamiento y consulte con su médico.

#### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o está planeando quedar embarazada o si está amamantando a su bebé, consulte con su médico antes de usar este medicamento.

#### **Conducir y operar máquinas**

Si su visión se encuentra temporalmente borrosa o afectada en algún sentido después del uso de CIPROFLOXACINA DENVER FARMA, no debería manejar u operar con máquinas hasta que su visión vuelva a ser clara nuevamente.

#### **Uso de otros medicamentos**

Avísele a su médico, si está tomando o recientemente a estado tomando algún medicamento, incluyendo los medicamentos que no requieren prescripción.

Si está usando más de un tipo de medicamento para los ojos, los medicamentos deben aplicarse con al menos 5 minutos de diferencia. Las pomadas oftálmicas deben aplicarse a lo último.

#### **Información importante si usted usa lentes de contacto**

CIPROFLOXACINA DENVER FARMA contiene un conservador (Cloruro de benzalconio) que puede causar irritación en los ojos y puede decolorar las lentes de contacto blandas.

No se debe usar lentes de contacto duras o blandas durante el tratamiento con CIPROFLOXACINA DENVER FARMA. Si usted debe continuar usando las lentes, debe sacárselas antes de aplicar CIPROFLOXACINA DENVER FARMA y esperar por lo menos 15 minutos antes de volver a colocárselas.

#### **¿Cómo se debe aplicar CIPROFLOXACINA DENVER FARMA?**

##### **La dosis usual**

La dosis va a depender si usted está siendo tratado por una úlcera de córnea o por alguna otra infección bacteriana en los ojos.

##### **Úlcera de córnea**

La dosificación se debe continuar durante la noche.

Día 1: 2 gotas en el ojo afectado cada 15 minutos durante las primeras 6 horas, luego 2 gotas cada 30 minutos.

Día 2: 2 gotas en el ojo afectado cada hora

Día 3 a Día 14: 2 gotas en el ojo afectado cada 4 horas.

Su médico le indicará si el tratamiento debe prolongarse más de 14 días.

##### **Otras infecciones bacterianas**

1 ó 2 gotas en el ojo afectado 4 veces al día.

Si la infección es severa, la dosis para los primeros 2 días se debe incrementar a 1 ó 2 gotas cada 2 horas, mientras usted se encuentre despierto.

Es importante que continúe aplicándose CIPROFLOXACINA DENVER FARMA durante el periodo completo del tratamiento que le indicó el médico, aún si sus síntomas mejoraron. Si se interrumpe la aplicación del medicamento antes de lo indicado por su médico los síntomas pueden volver.

No debería aplicarse CIPROFLOXACINA DENVER FARMA por más de 21 días, a menos que su doctor le dé otra indicación.

Aplíquese CIPROFLOXACINA DENVER FARMA exactamente como le indicó su médico. Si tiene alguna duda, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **Cómo se aplica**

- Lave sus manos antes de comenzar la aplicación.
- Saque la tapa del frasco gotero.
- Sostenga el frasco apuntando hacia abajo entre su pulgar y dedos.
- Incline su cabeza hacia atrás
- Baje el párpado inferior con un dedo, hasta que se forme un espacio entre su ojo y párpado. Las gotas debes aplicarse en ese lugar.

- Lleve el frasco cerca del ojo. Ayúdese para hacer esto con un espejo.
- No toque su ojo, su párpado, o áreas cercanas u otras superficies con el frasco gotero, ya que puede infectar el gotero y el producto.
- Presione suavemente la base del frasco para liberar una gota por vez.
- No apriete el frasco, solo se necesita una presión suave sobre el fondo del mismo.
- Si debe aplicarse gotas en los 2 ojos, repita los pasos con el otro ojo. Cierre correctamente el frasco gotero, inmediatamente después de su uso.
- Si una gota cae por fuera del ojo, aplíquela nuevamente.
- Si se olvidó de aplicar una dosis de CIPROFLOXACINA DENVER FARMA gotas no se preocupe, aplíquesela cuando corresponda la próxima dosis. No aplique una dosis doble para compensar.

- Si se aplica más gotas de las que debiera, debe lavarse el ojo con agua tibia.
- Si toma accidentalmente este medicamento, es probable que no le produzca ningún problema, pero igual contacte con su médico.
- Si tiene alguna pregunta más sobre su medicamento, consulte con su médico o farmacéutico.

Ante la eventualidad de una sobredosis concurrir al Hospital más cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/4962-2247

Hospital A. Posadas (011) 4658-7777/4654-6648.

#### **Los posibles efectos adversos**

Como todos los medicamentos CIPROFLOXACINA DENVER FARMA puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren.

• **Usted puede experimentar en sus ojos algunos o todos los efectos que siguen:**  
**Comunes** (1 a 10 pacientes en 100): Depósito blanco en la superficie del ojo (córnea), molestias (quemazón o picazón, sensación de arena en los ojos, irritación), enrojecimiento.

**No comunes** (1 a 10 pacientes de 1000): Daño en la superficie de los ojos (córnea), sensibilidad a la luz, visión borrosa, hinchazón del ojo o párpados, dolor, ojos secos, pinchazos, secreción ocular, formación de costras en los párpados, escamas oculares, enrojecimiento de los párpados, poca visión, ojos llorosos, ojos rojos.

**Raros** (1 a 10 pacientes en 10.000): Daño ocular, inflamación, visión doble, sensación de ojo disminuido, cansancio de ojos, orzuelo.

**Si nota partículas blancas en sus ojos**, continúe usando CIPROFLOXACINA DENVER FARMA pero infórmeme inmediatamente a su médico.

• **Usted también puede experimentar efectos en otras áreas de su cuerpo, que incluyen:**

**Comunes:** Gusto feo

**No comunes:** Dolor de cabeza, náusea.

**Raros:** Hipersensibilidad, mareo, dolor de oído, inflamación dentro de la nariz, descarga del seno nasal, diarrea, dolor abdominal, inflamación de la piel, trastorno del tendón.

**Si usted experimenta una reacción alérgica, interrumpa la aplicación de CIPROFLOXACINA DENVER FARMA.**

Notificación de los efectos adversos:

Ante cualquier inconveniente con el producto Usted puede:

- comunicarse al 4756-5436 o a la Página Web de Denver Farma:

[www.denverfarma.com.ar](http://www.denverfarma.com.ar)

- llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar-farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

**¿Cómo almacenar CIPROFLOXACINA DENVER FARMA?**