

INFORMACION PARA EL PACIENTE

MELOXICAM DENVER FARMA

MELOXICAM 15 mg

Comprimidos

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver Posibles efectos adversos.

Contenido del prospecto:

1. Qué contiene MELOXICAM DENVER FARMA

2. Qué es MELOXICAM DENVER FARMA y para qué se utiliza

3. Qué necesita saber antes de empezar a tomar MELOXICAM DENVER FARMA

4. Cómo tomar MELOXICAM DENVER FARMA

5. Posibles Efectos Adversos

6. Conservación de MELOXICAM DENVER FARMA

1. Qué contiene MELOXICAM DENVER FARMA

Cada comprimido de MELOXICAM DENVER FARMA contiene:

Meloxicam 15 mg,

Excipientes: Lactosa para compresión directa, Celulosa microcristalina, Citrato de sodio, Dióxido de silicio coloidal, Croscarmellosa sódica, Estearato de magnesio.

2. Qué es MELOXICAM DENVER FARMA y para qué se utiliza

MELOXICAM DENVER FARMA contiene el principio activo Meloxicam.

Meloxicam pertenece al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) utilizados para tratar el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. MELOXICAM DENVER FARMA está indicado en adultos y adolescentes mayores de 16 años para:

- Tratamiento de corta duración de las crisis agudas de artrosis (enfermedad de las articulaciones).

- Tratamiento a largo plazo del dolor relacionado con la artritis reumatoide (inflamación de las articulaciones).

- Tratamiento a largo plazo de una enfermedad articular de la columna vertebral llamada espondilitis anquilosante (inflamación de la columna).

3. Qué necesita saber antes de empezar a tomar MELOXICAM DENVER FARMA

No tome MELOXICAM DENVER FARMA:

- A partir de la semana 30 del embarazo.

- Si está amamantando.

- Si es un niño o adolescente menor de 16 años.

- Si es alérgico a Meloxicam o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en Qué contiene MELOXICAM DENVER FARMA).

- Si es alérgico al ácido acetilsalicílico (por ejemplo, aspirina) o a otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

- Si tiene antecedentes de sibilancias, opresión torácica, falta de aire (asma), bloqueo nasal debido a la inflamación de la parte interna de la nariz (pólipos nasales), hinchazón alrededor de los ojos, cara, labios, boca o garganta que conlleva dificultad para respirar (edema angioneurótico) o picor (urticaria) tras tomar ácido acetilsalicílico u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

- Si actualmente tiene una hemorragia en el estómago o el intestino.

- Si tiene o ha tenido dos o más episodios de úlceras o sangrado en el estómago o intestino. Si alguna vez ha tenido hemorragias o desgarros (perforaciones) en el estómago o el intestino tras el uso de un AINE.

- Si tiene o ha tenido un trastorno hemorrágico o una hemorragia cerebral (hemorragia cerebrovascular).

- Si tiene problemas graves del hígado.

- Si tiene problemas graves del riñón y no está recibiendo diálisis.

- Si tiene una enfermedad grave del corazón.

- Si está siendo tratado con un fármaco para el cáncer llamado pemetrexed y además presenta insuficiencia renal grave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar MELOXICAM DENVER FARMA:

- Si ha tenido previamente una inflamación del esófago (esofagitis); inflamación del revestimiento del estómago (gastritis) y/o úlceras de estómago, ya que su médico deberá comprobar que ya no tiene ninguna de estas enfermedades antes de que inicie el tratamiento.

- Si tiene antecedentes de problemas de estómago o intestino (como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn).

- Si es una persona de edad avanzada (debido al incremento de los efectos adversos).

- Si tiene un volumen sanguíneo muy bajo (es posible que haya tenido una gran pérdida de sangre, sometido a cirugía o una baja ingesta de líquidos).

- Si tiene otros problemas de riñón, hígado o corazón.

- Si sus niveles de potasio en sangre son elevados.

- Si está intentando quedarse embarazada o están analizando su fertilidad.

Los medicamentos como Meloxicam se pueden asociar con un moderado aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos (“infartos de miocardio”) o cerebrales. Cualquier riesgo es mayor a dosis altas y tratamiento prolongado. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendado.

- Si tiene problemas cardíacos (incluyendo angina o circulación reducida), antecedentes de ataques cerebrales, o piensa que podría tener riesgo de sufrir estas patologías (por ejemplo, tiene la tensión arterial alta, diabetes, colesterol alto, o es fumador), debe consultar este tratamiento con su médico o farmacéutico.

Se han descrito erupciones cutáneas que pueden amenazar la vida del paciente (síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica) con el uso de Meloxicam, inicialmente aparecen como puntos o manchas circulares rojizas, a menudo con una ampolla central. Otros signos adicionales que pueden aparecer son llagas en la boca, garganta, nariz, genitales y conjuntivitis (ojos hinchados y rojos).

Estas erupciones en la piel que pueden amenazar la vida del paciente, a menudo van acompañadas de síntomas de gripe. La erupción puede progresar a la formación de ampollas generalizadas o descamación de la piel. El periodo de mayor riesgo de aparición de reacciones cutáneas graves es durante las primeras semanas de tratamiento.

Si ha desarrollado síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica con el uso de Meloxicam, no debe utilizar Meloxicam de nuevo en ningún momento. Si desarrolla erupciones o estos síntomas en la piel deje de tomar Meloxicam, acuda inmediatamente a un médico e infórmele de que está tomando este medicamento.

Durante el tratamiento:

Hable con su médico de forma inmediata si aparecen problemas estomacales o intestinales (en concreto, hemorragia) durante los primeros días tras iniciar la toma de Meloxicam. Esto puede ocurrir si ha padecido problemas intestinales o si es una persona de edad avanzada. Puede detectarse una hemorragia intestinal si las heces tienen color negro similares al alquitrán o si se siente enfermo, puede contener partículas sanguíneas rojas u oscuras, que parecen granos de café (ver Posibles Efectos Adversos). Este medicamento puede afectar los resultados de ciertos análisis de sangre u orina. Informe a su médico o al personal del hospital que está tomando este medicamento si tiene que hacerse pruebas. Este medicamento puede enmascarar los síntomas de ciertas infecciones. Por ejemplo, puede enmascarar la fiebre. Si no se siente bien y cree que puede tener una infección, hable con su médico.

Toma de MELOXICAM DENVER FARMA con otros medicamentos:

Comuniqué a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. Los siguientes medicamentos pueden afectar o verse afectados por Meloxicam:

- Anticoagulantes (medicamentos utilizados para detener la coagulación de la sangre) como warfarina, heparina, dopicogrel, dabigatrán, apixaban y ticlodipina, ya que Meloxicam puede aumentar su efecto o que la probabilidad de hemorragia sea mayor.

- Otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como ácido acetilsalicílico (aspirina) o medicamentos conocidos como “inhibidores de la COX-2” como celecoxib.

- Litio (medicamento utilizado para trastornos mentales).

- Metotrexato (medicamento utilizado para la psoriasis, la inflamación y algunos cánceres).

- Trombolíticos (medicamentos utilizados para disolver coágulos en enfermedades del corazón).

- Clostriramina (medicamento utilizado para reducir los niveles de colesterol en sangre).

- Inhibidores de la calcineurina (medicamentos utilizados para tratar enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide o utilizados tras un trasplante de órgano) como ciclosporina o tacrolimus.

- Diuréticos (para aumentar la eliminación de orina).

- Medicamentos destinados a disminuir la presión arterial, llamados inhibidores de la ECA, antagonistas de la angiotensina II (sartanes) o betabloqueantes.

- Corticosteroides (para el asma, inflamaciones y después de cirugía de trasplante de órganos), ya que es posible que la probabilidad de padecer úlceras o hemorragias sea mayor.

- Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) (medicamentos utilizados para la depresión).

- Pemetrexed, medicamento utilizado para tratar ciertos tipos de cáncer. Es posible que tenga que dejar de tomar este medicamento durante al menos 5 días antes, durante y 2 días después de recibir pemetrexed.

- Medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio en la sangre. Esto incluye sales de potasio o suplementos, ciertos diuréticos (por ejemplo, espironolactona) o el antibiótico trimetoprima.

- Deferasirox, medicamento utilizado para reducir los niveles de hierro en el organismo.

- Antidiabéticos orales (sulfonilureas y nateglínida). Medicamentos utilizados para tratar la diabetes. Su médico debe controlar cuidadosamente su glucemia para determinar el riesgo de hipoglucemia.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Embarazo

No tome este medicamento después de la semana 20 del embarazo a menos que su médico específicamente se lo indique (usualmente en dosis bajas y por pocos días), ya que Meloxicam puede conllevar graves efectos cardíacos y renales en el feto.

El uso de antiinflamatorios no esteroides (AINE) alrededor de las 20 semanas de embarazo o después puede ocasionar un raro pero serio problema en los riñones del feto. Esto puede llevar a bajos volúmenes del líquido amniótico que rodea al bebé y posibles complicaciones. Luego de aproximadamente 20 semanas de embarazo los riñones de los bebés por nacer producen la mayor parte del líquido amniótico, por lo que los problemas renales pueden provocar volúmenes bajos de este fluido. El líquido amniótico proporciona una protección como amortiguador y ayuda al desarrollo de los pulmones, el sistema digestivo y al desarrollo de los músculos.

Alrededor de las 30 semanas, los AINEs pueden causar un problema que puede resultar en un trastorno cardíaco en el feto.

Si un profesional de la salud lo considera necesario, el uso de AINE entre las 20 y 30 semanas de embarazo debe limitarse a la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible.

Meloxicam también puede afectar a las contracciones durante el parto, lo que conlleva a un retraso del parto o a un parto prolongado o puede causar que la paciente padezca una hemorragia de mayor duración tras dar a luz. No se recomienda tomar Meloxicam durante los 6 primeros meses del embarazo.

Lactancia

Los AINEs pueden pasar a la leche materna. No debe dar el pecho mientras esté tomando este medicamento.

Fertilidad

Puede resultar más complicado quedarse embarazada con este medicamento. Hable con su médico si está pensando en quedarse embarazada o si le están investigando su fertilidad.

Conducción y uso de máquinas

Meloxicam puede producir efectos adversos que pueden afectar a la capacidad de conducir y utilizar maquinaria. Algunos ejemplos de estos efectos incluyen trastornos visuales como visión borrosa, somnolencia, mareos, una sensación gítoratoria (vértigo) y otros problemas que afectan al cerebro. En caso de sufrir alguno de estos efectos es recomendable abstenerse de conducir o utilizar maquinaria.

MELOXICAM DENVER FARMA contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Este medicamento no contiene gluten.

4. Cómo tomar MELOXICAM DENVER FARMA

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Su médico le dará la dosis más baja posible, durante el periodo de tiempo más corto posible, para tratar sus síntomas. Si no mejora o si sufre algún efecto adverso, dígaselo a su médico. Su médico controlará su estado y tratamiento.

Uso en adultos y adolescentes mayores de 16 años

Crisis agudas de artrosis: La dosis recomendada es 7,5 mg por día. Su médico puede incrementar esta dosis a 15 mg una vez al día si no se han observado mejoras.

Tratamiento de la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante: La dosis recomendada es de 15 mg al día. Su médico puede reducir su dosis hasta 7,5 mg al día si sus síntomas mejoran. Nunca debe excederse una dosis de 15 mg al día.

Pacientes con disminución de la función del riñón e hígado: En pacientes sometidos a diálisis con

insuficiencia renal grave, la dosis no debe exceder de 7,5 mg al día. A los pacientes con problemas de riñón o hepáticos que no sean graves se les pueden administrar las dosis recomendadas normales para adultos, según se describe más arriba.

No se recomienda el uso de Meloxicam en pacientes con insuficiencia renal grave que no estén sometidos a diálisis o con insuficiencia hepática grave.

Uso en pacientes de edad avanzada: Si es una persona de edad avanzada, su médico puede recomendarle una dosis más baja. La dosis recomendada para el tratamiento de la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante es de 7,5 mg al día.

Uso en niños y adolescentes

Los niños y adolescentes menores de 16 años no deben tomar Meloxicam.

Tome Meloxicam en forma de una dosis oral única con agua u otros líquidos durante una comida.

El comprimido de 15 mg se puede partir en dos dosis iguales.

Si toma más MELOXICAM DENVER FARMA del que debe

Si ha tomado más Meloxicam del que debe, consulte inmediatamente a su médico. Lleve este prospecto y los comprimidos que todavía conserve.

Puede padecer una reacción alérgica (ver Posibles Efectos Adversos) o sentirse débil, somnolencia, malestar (náuseas) o vómitos, padecer dolores de estómago o hemorragia del estómago o del intestino. Algunos efectos de mayor gravedad pueden ser presión arterial elevada, insuficiencia renal, problemas hepáticos, problemas respiratorios, coma, ataques (convulsiones) o problemas cardíacos. El tratamiento tras una sobredosis de AINE debe ser sintomático y con medidas de soporte. En un ensayo clínico se puso de manifiesto la eliminación acelerada de Meloxicam mediante dosis orales de 4 g de colestiramina administrada tres veces al día.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas, Tel: (011) 4654-6648/4658-7777 y 0800-333-0160.

Si olvidó tomar MELOXICAM DENVER FARMA

Si olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que falte poco para la próxima dosis. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con MELOXICAM DENVER FARMA

No deje de tomar el medicamento sin comunicárselo a su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

5. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar este medicamento y póngase inmediatamente en contacto con su médico o diríjase a urgencias del hospital más cercano, si presenta alguno de estos efectos:

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Reacciones en la piel como sarpullido con picazón o hinchazón de la cara, ojos, boca, labios, lengua o garganta, que pueden dificultar la deglución o la respiración.
- Hemorragia estomacal o intestinal, que puede detectarse al observar sangre en las heces, heces negras parecidas al alquitrán o si se siente enfermo, pueden contener partículas sanguíneas rojas u oscuras que parecen granos de café.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

- Un aumento de las infecciones, que pueden observarse como fiebre, escalofríos intensos, dolor de garganta o úlceras bucales (esto puede indicar que tiene un número bajo de glóbulos blancos).
- Reacciones cutáneas potencialmente mortales como amplias zonas de piel enrojecida, con ampollas o descamación y sangrado de labios, genitales, ojos o boca (estos pueden incluir síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica).
- Reacción cutánea con picazón de color rojo (ronchas).
- Una úlcera en el estómago o el intestino. Puede notar una hinchazón del estómago, ardor doloroso o sensibilidad en el área del estómago o del intestino, pérdida de apetito, sensación de mareo (náuseas) con o sin vómitos. También puede notar sangrado del estómago o el intestino.

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

- Coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos, orina oscura, heces de color blanquecino y sensación de malestar general (esto puede indicar que tiene problemas graves en el hígado).
- Producción de orina escasa o nula, dolor o dificultad al orinar, orina turbia u oscura, sangre en la orina o lumbalgia (pueden indicar problemas graves renales, que se observan en pacientes con factores de riesgo como bajo volumen sanguíneo, edad avanzada y problemas cardíacos, renales o hepáticos graves).

- Un desgarro en el estómago o el intestino. Es posible que tenga dolor severo o hemorragia en el estómago o el intestino.

- Una reducción drástica de glóbulos blancos en sangre. Puede notar un aumento de infecciones.
- Sarampión extenso en forma de erupción en todo el cuerpo.

- Ampollas que se forman entre las capas de la piel, generalmente en las piernas y los brazos, que pueden estallar.

Los medicamentos como Meloxicam pueden estar asociados con un pequeño aumento del riesgo de ataque al corazón o un derrame cerebral.

- Si tiene dolor severo en el pecho, que puede repercutir en la mandíbula y el brazo, se siente sudoroso o tiene dificultad para respirar, estos pueden ser signos de un ataque al corazón.
- Si tiene entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, nota que uno de los lados de la cara se le cae, tienen problemas para hablar o visión borrosa o pérdida de la visión, estos pueden ser signos de un derrame cerebral.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- Reacciones alérgicas graves, que pueden causar picazón en la piel, erupción cutánea roja, inflamación de la cara, ojos, boca, labios, lengua o garganta que puede causar dificultad al tragar o respirar, sensación de desmayo o mareos, sibilancias, colapso o pérdida de la conciencia. Otros efectos adversos son:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- Indigestión.
- Náuseas (sentirse enfermo).
- Vómitos (estar enfermo).
- Dolor de estómago.
- Estreñimiento.
- Gases.
- Diarrea.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Dolor de cabeza.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Palidez con dolor de cabeza, dificultad para respirar a la hora de practicar ejercicio o sentirse anormalmente cansado (pueden indicar un número bajo de glóbulos rojos).
- Otras reacciones alérgicas, que pueden causar estornudos y picazón en los ojos.
- Mareo.
- Una sensación giratoria (vértigo).
- Somnolencia. Aumento de la tensión arterial.
- Enrojecimiento.
- Inflamación de estómago o el intestino.
- Eructos.
- Niveles elevados de potasio o sodio en sangre.
- Llagas en la boca.
- Alteraciones en la función renal o hepática, detectadas en un análisis de sangre.
- Hinchazón (retención de líquidos), especialmente, de los pies o los tobillos.
- Erupción.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

- Cardenales sin causa aparente o hemorragias que duran más de lo habitual (pueden indicar una cifra baja de plaquetas en la sangre).
 - Alteraciones en la sangre, detectadas en un análisis de sangre.
 - Alteraciones del estado de ánimo.
 - Pesadillas.
 - Zumbido de oídos.
 - Latidos cardíacos rápidos, que se perciben como punzantes en el tórax (palpitaciones).
 - Problemas de visión como visión borrosa o lagrimeo, picor ocular (conjuntivitis).
 - Opresión torácica, dificultad para respirar o sibilancias (es posible que padezca asma, en especial si es alérgico a otros AINEs como el ácido acetilsalicílico).
 - Acidez, puede ser un signo de que padece una inflamación del esófago (esofagitis).
 - Inflamación del intestino grueso, que puede causar dolor, calambres y diarrea.
- Frecuencia no conocida*** (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
- Sensibilidad de la piel a la luz, quemadura solar con mayor facilidad.
 - Confusión.
 - Desorientación.
 - Pancreatitis (inflamación del páncreas).
 - Esterilidad femenina, retraso en la ovulación.

Otros efectos adversos observados en otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), pero que todavía no se han observado con Meloxicam:

- Insuficiencia cardíaca.
- Otros problemas renales graves.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Ante cualquier inconveniente con el producto Usted puede:

- comunicarse al 4756-5436 o a la Página Web de Denver Farma: www.denverfarma.com.ar

- llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

6. Conservación de MELOXICAM DENVER FARMA

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30°C, en lugar seco.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No tome este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el blíster y el estuche.

Conservar en el envase original.

Presentación:

MELOXICAM DENVER FARMA 15 mg se expende en envases con 10 y 30 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51.332

DENVER FARMA S.A. Natalio Querido 2285 (B1605CYC) Munro, Provincia de Buenos Aires.

Elaborado en su planta de Manufactura Centro Industrial Garín.

Director Técnico: José Luis Tombazzi, Farmacéutico.

Fecha de Última revisión: Abril 2021

Rv 09/21

Cód. 7328