

DENVERCREM®

GENTAMICINA 17 VALERATO DE BETAMETASONA NITRATO DE MICONAZOL

CREMA
USO EXTERNO

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

FORMULA: 100 g de crema contienen: Gentamicina (como sulfato) 0,1 g, 17-Valerato de Betametasona 0,1 g, Nitrato de Miconazol 2 g, cera autoemulsionable, vaselina líquida, vaselina sólida, propilenglicol, edetato disódico, polisorbato 80, metilparabeno, propilparabeno, agua purificada c.s.p.

ACCION TERAPEUTICA: crema tópica con propiedades antibacterianas (Gentamicina), antiinflamatoria (17-Valerato de Betametasona) y antimicótica (Nitrato de Miconazol).

INDICACIONES: dermatopatías inflamatorias complicadas por infección bacteriana, micótica o mixta; dermatitis infectadas secundariamente por bacterias u hongos; infecciones bacterianas o micóticas que presenten una marcada reacción inflamatoria.

POSOLOGIA / DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION: aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el área afectada una o dos veces por día, según prescripción médica.

CONTRAINDICACIONES: está contraindicada en tuberculosis cutánea, o dermatosis luética o afecciones virales (por ejemplo: herpes simple, varicela zóster). Hipersensibilidad a algún componente del preparado.

PRECAUCIONES: la administración tópica de corticoides en animales preñados puede provocar anomalías en el desarrollo fetal. La importancia de este hallazgo para el hombre aún no ha sido establecida, no obstante, los corticoides tópicos no deben utilizarse en forma extensa durante el embarazo, es decir en grandes cantidades o durante períodos prolongados.

ADVERTENCIAS: en caso de ocurrir sensibilización con el empleo del producto deberá interrumpirse el tratamiento. Evitar el contacto con la conjuntiva ocular. No se recomienda utilizar el producto en presencia de rosácea o dermatitis perioral.

REACCIONES ADVERSAS: en general el producto es bien tolerado. Ocasionalmente, cuando se tratan áreas cuya extensión es igual o mayor al 10% de la superficie corporal y cuando la duración del tratamiento es superior a 4 semanas, pueden observarse manifestaciones secundarias locales, tales como atrofia cutánea, irritación, estrías, prurito, sequedad, telangiectasias y foliculitis, así como efectos sistémicos por absorción del corticoide. Estos efectos se observan principalmente si se aplican vendajes oclusivos o si se utiliza durante períodos prolongados.

SOBREDOSIFICACION: es muy improbable que ocurra una sobredosificación aguda. No obstante, en caso de abuso o de sobredosificación crónica pueden aparecer manifestaciones de hipercorticismismo, en cuyo caso los esteroides tópicos deben suspenderse. Ante la eventualidad de una sobredosificación comunicarse con los centros de toxicología.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4962-6666/2247

Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas, Tel: (011) 4654-6648/4658-7777 y 0800-333-0160

PRESENTACION: 20g PARA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONDICIONES DE CONSERVACION: Conservar entre 5°C y 25°C

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 48.382

DENVER FARMA S. A. N. Querido 2285 (B1605CYC) Munro. Pcia. de Buenos Aires.

Elaborado en su Planta de Manufactura, Centro Industrial Garín.

Director Técnico: José Luis Tombazzi, Farmacéutico.

Servicio de atención al usuario: 4756-5436

Rv 06/10