

DICLOFENAC DENVER FARMA

DICLOFENAC DIETILAMINA

GEL USO EXTERNO

Venta Libre

Industria Argentina

FORMULA

100 gramos contienen: Diclofenac dietilamina 1,16 g (equivalente a 1 g de Diclofenac Sódico), carbopol 940, metilparabeno, avicel RC 591, polietilenglicol 400, trietanolamina, propilenglicol, esencia de lavanda, alcohol isopropílico, alcohol etílico, agua purificada c.s.

ACCION TERAPEUTICA

Analgésico y antiinflamatorio.

POSOLOGIA / DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION

Uso del medicamento: Lea detenidamente esta información: DICLOFENAC DENVER FARMA es analgésico y antiinflamatorio. El gel, es absorbido a través de la piel aliviando los síntomas de inflamación y dolor. DICLOFENAC DENVER FARMA puede emplearse en inflamación de tendones, músculos, articulaciones y ligamentos por esguinces, distensiones y traumatismos. Luxaciones, codo de tenista, hombro bloqueado y dolores musculares. Artritis, lumbalgia, dolor de espalda, cuello y torticólis.

Como usar este medicamento: depende del área que deba ser tratada.

Adultos y niños mayores a 12 años aplicar el gel sobre la piel 3 a 4 veces por día friccionando suavemente la zona afectada. Aplique la cantidad necesaria de gel para cubrir la extensión de la zona dolorosa. Generalmente bastará una cantidad similar a una nuez o una cereza por aplicación según el área afectada. **Importante:** tras la aplicación lávese las manos, salvo que sean éstas la zona a tratar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No utilizar este medicamento en las siguientes situaciones:

-Hipersensibilidad a alguno de sus componentes en particular al principio activo (Diclofenac).

-Embarazo y lactancia, salvo que el médico lo haya indicado expresamente.

-Lactantes y niños de primera infancia (hasta los 6 años).

-Personas a la que el ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroideos puedan provocarles ataques de asma, urticaria o rinitis aguda.

Aplicar en superficies cutáneas sanas e intactas (ausencia de heridas o lesiones abiertas), evitando que entre en contacto con los ojos o las mucosas. Uso externo, no ingerir. Si el dolor persiste luego de 14 días de tratamiento o empeora, consulte a su médico.

REACCIONES ADVERSAS

DICLOFENAC DENVER FARMA gel, normalmente es bien tolerado, pero como todos los medicamentos, puede causar a veces efectos indeseados. Los más comunes son picazón, enrojecimiento, hinchazón o ampollas en la zona tratada. Raramente puede ocurrir erupción cutánea generalizada, reacciones alérgicas que se manifiesten como dificultades respiratorias o hinchazón en la cara y mayor sensibilidad cutánea a la luz solar.

Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de emplear DICLOFENAC DENVER FARMA y consulte inmediatamente a su médico.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas, Tel: (011) 4654-6648/4658-7777 y 0800-333-0160

PRESENTACION: pomo con 50 g de gel.

CONDICIONES DE CONSERVACION

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 44.674.

DENVER FARMA S.A. Natalio Querido 2285 - (B1605CYC) Munro, Pcia. de Buenos Aires.

Elaborado en su Planta de Manufactura, Centro Industrial Garín.

Director Técnico: José Luis Tombazzi - Farmacéutico.

Servicio de atención al usuario: 4756-5436

RV 06/08