

# OFTALOOK® PLUS

## HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 0,3 %

### SOLUCION OFTALMICA ESTERIL

#### *Lubricante ocular*

Venta Libre

Industria Argentina

#### FORMULA

Cada g de OFTALOOK® PLUS contiene: Hidroxipropilmetilcelulosa 3 mg, cloruro de sodio, cloruro de potasio, ácido bórico, ácido fosfórico, perborato de sodio tetrahidrato, agua para inyectable c.s.

#### ACCION TERAPEUTICA

Lubricante ocular.

#### INDICACIONES

**Lea detenidamente esta información.**

OFTALOOK® PLUS está indicado para el alivio de los síntomas en todos los casos de ojos secos; queratoconjuntivitis seca, debida a una insuficiente secreción de las glándulas lacrimales; parálisis facial; xerosis de la córnea; ojos secos por el viento, smog, tierra; irritación producida por el agua de piscinas.

#### COMO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

Primeramente lave bien sus manos, luego instile una o dos gotas en cada ojo (evite el contacto entre el ojo y la boca del gotero) tan frecuentemente como sea necesario. Antes de colocar la lente de contacto, hidrátela con un par de gotas.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

#### ADVERTENCIAS

En caso de experimentar dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o irritación ocular continua, o si estos síntomas empeoran o persisten durante más de 24 horas, suspender el uso de esta medicación y consultar de inmediato al médico.

#### PRECAUCIONES

Para evitar la contaminación del producto el borde del frasco no tiene que tocar ninguna superficie y deberá taparse inmediatamente después de su uso.

**Uso durante el embarazo y la lactancia:** debido a que OFTALOOK® PLUS ejerce solo una acción tópica como lubricante ocular, no se establecen restricciones para su uso durante el embarazo y la lactancia, no obstante: *si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de utilizar este*

*medicamento.*

**Uso pediátrico:** puede ser utilizado en niños bajo las pautas establecidas en "Cómo utilizar este medicamento".

**Interacciones:** ninguna conocida a la fecha. En caso de otro tratamiento ocular local, se debe dejar un intervalo mínimo de 5 minutos entre las aplicaciones y OFTALOOK® PLUS debe ser la última medicación instilada.

#### REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad en casos muy raros. Ocasionalmente puede producir ardor o puntadas, reacciones alérgicas y ojos enrojecidos después de la colocación de las lentes de contacto. Si se advierte alguna de estas reacciones consultar al oftalmólogo.

#### SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

**Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4962-6666/2247.**

**Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas, Tel: (011) 4654-6648/4658-7777 y 0800-333-0160.**

**Recomendaciones de uso:** para uso tópico ocular únicamente. Se recomienda cerrar inmediatamente el frasco después de cada instilación. No utilizar si la solución cambia de color o se pone turbia. Sin abrir, las gotas oftálmicas pueden ser utilizadas hasta la fecha de vencimiento indicada en el estuche.

#### PRESENTACION

Frasco gotero con 15 ml de solución oftálmica.

#### CONDICIONES DE CONSERVACION

Conservar entre 15°C y 30°C.

**"LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO"**

#### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 52.241

#### DENVER FARMA S.A.

Natalio Querido 2285 - (B1605CYC) Munro - Provincia de Buenos Aires.

Elaborado en su Planta de Manufactura, Centro Industrial Garín.

**Director Técnico:** José Luis Tombazzi - Farmacéutico

**Servicio de atención al usuario:** 4756-5436

RV 12/15

#### CONTROLE SU PRESION OCULAR

Mañana puede ser demasiado tarde.  
Visite periódicamente al Médico Oftalmólogo